

特定非営利活動法人 日本バードレスキュー協会




理念と目的

傷病鳥の救護活動を通して多様な自然の仕組みを学び
人と自然が共生できる社会の実現を目指そう

1. 野生傷病鳥の救護と野生復帰
2. 救護技術の向上と救護にかかわる知識の蓄積
3. 野生傷病鳥の救護活動を通しての環境教育
4. 野生鳥類にかかわる資料収集と調査・研究

バードレスキューが救護しようとしている鳥たち

バードレスキューでは油流出事故による汚染や窓ガラスへの衝突事故、農薬による衰弱など人との軋轢の中で傷ついた野鳥を救護し、野生復帰する活動を行っています



油が付着し飛べなくなったシロエリオオハム



防鳥ネットに絡まり飛べなくなったフクロウ



衝突事故で体がマヒしたアカショウビン



ネコに襲われケガをしたカワラバト




交通事故で脚と翼を骨折したゴイサギ



密猟され狭い籠で飼われていたオオルリ

衝突事故



野鳥がバードレスキュー協会に運ばれてくる原因は様々ですが最も多いのは車や窓ガラスにぶつかる衝突事故です。




鳥がガラスに映った雲や樹を本物と間違っ
てぶつかる事故が多く発生しています。写
真のようなビルでは毎年多くの野鳥が窓に
衝突して保護されたり、命を落としたりし
ていることでしょう。私たちは「バードセ
イバー」と呼ばれるシールを窓に貼って野
鳥の衝突事故を防ぐ活動を行っています。



窓ガラスに激突したハヤブサ 右翼が折れ、嘴が変形している




車にはねられたオオコノハズク 左右の瞳孔の大きさが異なる



オリジナルバードセイバーを窓に貼って衝突事故を防ごう

ヒナの誘拐



2016年度相談件数の推移



誤って保護されたチョウゲンボウの巣立ちヒナ



親から引き離されてしまったカルガモのヒナ



毎年、5月から8月まで協会事務所にヒナを保護したと言う相談が寄せられます。多くの野鳥のヒナは上手く飛べない状態で巣立ち、一定期間親に付いて餌の取り方や飛び方を学んでから自立します。子連れの鳥に近づくと親は警戒して姿を隠し、飛べないヒナが残されますが、決して見捨てられたのではなく近くで親は見守っています。

このような状態のヒナを親からはぐれたものと勘違いして連れ帰ることは保護ではなく「**誘拐**」です。迷子に見えるヒナを見つけても決して手を出さずできるだけ早くその場を立ち去るようにしましょう。交通量が多くそのままでは車にひかれそうな場合には近くの安全そうな植え込みなどに移動させても大丈夫です。

誘拐されたヒナを人が餌を与えて育てることはとても難しいですが、鳥の種によってはできることもあります。しかし、飛べるようになるまで育てることができても、自然の中での餌の取り方や外敵から身を守る方法を人はヒナに教えることができません。人に育てられたヒナが自然の中で生きて行くことはとても難しいのです。

フクロウのヒナは写真のようにほとんど飛べない状態で巣立ちます。地上でじっとしているところを目撃することも少なくありません。このような状態のヒナが誤って保護されバードレスキューに連れてこられることが度々あります。親フクロウに襲われることもあるので、見かけても手を出さずそっとその場を離れるようにしましょう。

施設

主要設備

所在地

開設日

大型ケージ

中型ケージ

小型ケージ

飼養実績

事務所外観

大型ケージ

小型ケージ

小山田事務所

大阪府河内長野市

2011年4月

2基

5基

20基

2011年4月

～2018年3月

73種903羽を収容

603羽を野生復帰させた



篠山事務所

兵庫県丹波篠山市

2019年5月

3基

2基

5基

2019年5月

～現在

4種5羽を収容

1羽を野生復帰させた



野鳥のエサと給餌量

主な野鳥の体重と1日あたりの必要熱量

種名	体重（g）	熱量/日（kcal）	人工飼料
ゴイサギ	400～800	79～132	ワカサギ
カルガモ	750～1350	126～195	コマツナ パン ニワトリ用飼料 九官鳥の餌、ミルワーム
キジバト	400～800	78～132	ハト用配合飼料 パン 九官鳥の餌
バン	200～450	47～86	コマツナ 九官鳥の餌 ミルワーム キャットフード
オオタカ	656～～45	114～150	マウス ササミ レバー
サシバ	380～440	76～84	マウス ササミ レバー
チョウゲンボウ	191～299	45～63	マウス ササミ レバー
カッコウ	70～130	21～34	ミルワーム サシ 九官鳥の餌 すり餌（5～7分） 卵黄
アオバズク	185～227	44～51	マウス ササミ レバー ミルワーム
カワセミ	30	11	ワカサギ キンギョ 魚類ミンチ
ツバメ	17	12	ミルワーム 九官鳥の餌 すり餌（5～7分）
ヒヨドリ	60～86	31～41	九官鳥の餌 すり餌（5分） トマト 果実 （カキ、ミカン） ミルワーム
ジョウビタキ	15	11	すり餌（5分） ミルワーム
ツグミ	65～107	33～48	すり餌（5分） 九官鳥の餌 ミルワーム
キビタキ	14～17	11～12	すり餌（5分） 九官鳥の餌 ミルワーム
エナガ	6～8	6～7	すり餌（5分） 九官鳥の餌 ミルワーム
シジュウカラ	14～17	11～12	すり餌（5分） 九官鳥の餌 麻の実 ミルワーム
メジロ	11	9	すり餌（3分） 九官鳥の餌 果実 ミルワーム
ホオジロ	20～26	14～17	小鳥の餌 すり餌
カワラヒワ	17～30	12～19	小鳥の餌 麻の実 ヒマワリ コマツナ
スズメ	24	16	小鳥の餌 すり餌 ミルワーム 九官鳥の餌
ムクドリ	75～90	37～42	すり餌（5分） 九官鳥の餌 果実
ハシブトガラス	600～750	176～208	ドッグフード 九官鳥の餌 ササミ レバー

代替飼料の熱量（100g）

飼料名	kcal	備考
すり餌	150	水を加えて練った完成品
ミルワーム	210	ドッグフード、野菜くずを与え栄養改善
コオロギ	140	
九官鳥のエサ	330	
バナナ	86	糖度が高く選好性が良い但与えすぎに注意
ミカン	45	糖度が高く選好性が良い但与えすぎに注意
カキ	60	糖度が高く選好性が良い但与えすぎに注意
ササミ（ニワトリ）	120	感染症のリスクがあり給餌しない施設もある
レバー（ニワトリ）	111	感染症のリスクがあり給餌しない施設もある
ワカサギ	100	
アジ	144	
アカネズミ	1.64	*糸川拓真 et.al（日本鳥学会2009年大会）より引用
アオダイショウ	1.47	*糸川拓真 et.al（日本鳥学会2009年大会）より引用
アマガエル	1.14	*糸川拓真 et.al（日本鳥学会2009年大会）より引用

日本標準食品成分表
finek 2002
野生動物救護の症例144 2001

体重を基準とした給餌量の計算式

スズメ目

$258 \times W^{0.75}$

(Kcal/day)

非スズメ目

$156 \times W^{0.75}$

(Kcal/day)

W = 体重

(kg)

必要水分は出血や下痢等の症状により大幅に変化するので注意が必要

図中のカロリーは健康体の維持に必要なカロリーであり、自由生活をする場合はこの1.41倍、
痩せている個体の回復には1.75 倍、幼鳥には2 倍のカロリーが必要とされている

いずれも目安であり、常時体重を測定しながら給餌量を加減するものとする

黒沢信道 野生動物救護の症例 1 4 4 野生動物救護研究会 2001年 より抜粋